

CONTRIBUTION A LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
LXVIII. — PLANTES DE COLLECTEURS DIVERS

Par A. GUILLAUMIN.

(Muséum national d'Histoire Naturelle)

Xylosma nervosa Guillaum. — Canala (*Vieillard* 3258).

Pittosporum gracile Panch. ex Brong. et Gris. — Canala (*Vieillard* 2305), Wagap (*Vieillard* 2190), Canala, île Tupiti (*Vieillard* 2306 bis, *Deplanche* 256).

P. Pancheri Brong. et Gris. — Nouvelle-Calédonie (*Vieillard* 2313).

Erythroxyton novo-caledonicum O. E. Schultz-Prony (*Balansa* 454), embouchure du Douthio (*Balansa* 3048), Baie Duperré (*Balansa* 1659 a), île Montravel (*Balansa* 1659).

Boronella verticillata Baill. ex Guillaum. — Ouatendé près Gatope (*Vieillard* 2448).

Fagara Le Ratii Guillaum. — Mont Humboldt (*Schlechter* 15335).

Murraya crenulata Oliv. — Canala (*Deplanche* 8).

Elæodendron humboldtianum Guillaum. sp. nov.

Arbor 6-8 m. alta, ramis nigrescentibus, foliis ovato-spathulatis (usque ad 12 cm. × 4,5 cm.), coriaceis, venis immersis, integerrimis, basi in petiolum 2 cm. longum longe cuneatis, apice rotundatis emarginatulisve. Infructescentiae 3-4 cm. longae, sat robustae, fructibus obovatis (3 cm. × 2 cm.), 5 locularibus.

Mont Humboldt (*Balansa* 3612).

L'échantillon : Canala (*Vieillard* 3232) consiste en fleurs et en fruits isolés, les feuilles semblables à celles du type, sauf un peu plus larges et souvent un peu acuminées ; les fruits plus petits (2 cm. × 1,5 cm.), atténués au sommet, à 3 loges ressemblent tout à fait à ceux de l'*E. Vieillardii*.

Ximenia elliptica Forst. — Nouvelle-Calédonie (*Baudouin* 265), Gatope (*Vieillard* 199).

Olax hypoleuca Baill. — Wagap (*Vieillard* 3127, 3128).

Spondias dulcis Forst. f. — Nouvelle-Calédonie (*Pancher*).

Alphitonia xerocarpa Baill. — Cap Tonnerre (*Vieillard* 1495).

Pueraria neo-caledonica Harms. — Gatope (*Vieillard* 377).

Rhynchosia minima DC. — Nouvelle-Calédonie (Baudouin 216).
Spohora tomentosa L. — Nouvelle-Calédonie (Baudouin 600).
Albizzia Lebbek Benth. — Sans localité (Cribs 2)¹.
Melaleuca Leucadendron L. — Sans localité (Cribs 1).
Jambosa pseudo-malaccensis Vieill. ex Brong. et Gris. — Nouvelle-Calédonie (Baudouin).

E. stricta Panch. ex Brong. et Gris. — Mont Ouatendé près Gatope. (Vieillard 2608).

Syzygium artense Montr. ex Guillaum. et Beauvis. — Wagap (Vieillard 539).

S. patens Panch. ex Brong. et Gris. — Mont Dore (Vieillard 2609).

Bikkia campanulata Schltr. — Nouvelle-Calédonie (Baudouin 796).

B. macrophylla Schum. — Nouvelle-Calédonie (Baudouin 352, 901).

B. Pancheri Guillaum. — Lifou (Vieillard 2195).

Morierina montana Vieill. — Wagap (Vieillard 2709).

Ixora collina Beauvis. (1901) = *I. bracteata* Hochr. (1910) = *Charpentiera bracteata* Vieill. in herb.

I. yahouensis Schltr. (1906) = *I. neo-caledonica* Hochr. (1910).

Jussieuaea angustifolia Lam. — Balade (Vieillard 433), Tchiao (Balansa 3176), Nouvelle-Calédonie (Pancher).

J. caryophyllea Lam. = *Ludwigia parviflora* Roxb. — Plaine de Caricaté (Balansa 2766), au-dessus de Tchiao (Balansa 3177).

Jeanneney (*Nouv. Caléd. agr.*, p. 91) a signalé en Nouvelle-Calédonie un *J. grandiflora* et un *J. villosa*; il me paraît évident que le premier correspond au *J. angustifolia* et le second au *J. suffruticosa*, en sorte qu'il n'existe que trois espèces pouvant se différencier ainsi :

A. — Graines presque didymes, capsules longues de 3-4 cm.

a) Plante velue, bractéoles à la base de la fleur... *J. suffruticosa*

b) Plante glabre, bractéoles insérées à mi-hauteur de l'ovaire *J. angustifolia*

B. — Graines ellipsoïdes, capsules courtes (1 cm.), plante glabre *J. caryophyllea*

Wahlenbergia gracilis A. DC. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche 238, Vieillard 820, Brousmiche), Nouméa (Balansa 494), Nouméa, Ile des Pins (Pancher), Ile des Pins (Pancher 484 bis), Lifou (Vieillard 820 in Deplanche).

Jasminum didymum Forst. — Anse Vata (Brousmiche 577).

J. noumeense Schltr. = *J. Magentae* Guillaum. = *J. Bouquetii* Jeanneney (nomen). — Nouvelle-Calédonie (Mueller, Pancher, 517, Deplanche 335, 336, et sans n^o, Vieillard 2936), Nouméa (Vieillard 106, 912, Balansa 1703), îlots de Saint-Vincent (Vieillard 906),

Prony (*Balansa* 579), Nouvelle-Calédonie et île des Pins (*Pancher* 315, 586, et sans n°).

C'est à cette espèce et non au *J. neo-caledonicum* Schltr. qu'il faut rapporter l'échantillon *Franc* 845.

J. pulchrefoliatum Guillaum. — Nouvelle-Calédonie (*Pancher*).

Notelea Francii Guillaum. — Uraï (*Lecard*).

Olea Thozetii Panch. et Seb. — Nouméa (*Brousmiche*), Kouenthio (*Brousmiche*).

Pseudanthemum Balansae Guillaum.² — Nouvelle-Calédonie (*Baudouin* 705), Canala (*Vieillard* 1041).

P. tuberculatum Radlk. — Nouméa (*Baudouin* 370).

P. variabile Radlk. — Nouvelle-Calédonie (*Baudouin*).

Graptophyllum pictum Griff. = *G. hortense* Nees. — Dombéa (*Baudouin* 340).

Nepenthes Vieillardii Hook.f. — Wagap (*Vieillard* 1122).

Piper austro-caledonicum A. D. C. — Nouvelle-Calédonie (*Baudouin* 870).

Cryptocarya elliptica Schltr. — Wagap (*Vieillard* 3107).

Litsea Lecardii Guillaum. — Wagap (*Vieillard* 3109, 3111).

L. Ripidion Guillaum. — Bords de la Dombéa (*Vieillard* 3132).

L. triflora Guillaum. — Houailou (*Vieillard* 3122), Wagap (*Vieillard* 3117).

Grevillea Meissneri Montr. — Nouvelle-Calédonie (*Baudouin* 632).

Stenocarpus Milnei Hook. — Nouvelle-Calédonie (*Baudouin* 633), Gatope (*Vieillard* 2212, 3095).

S. trinervis Guillaum. — Montagnes de Nakéty (*Vieillard* 1093, 3088).

S. umbellatus Schltr. var. *Billardieri*. — Canala, Wagap, Gatope (*Vieillard* 1904).

S. umbellatus Schltr. var. *Forsteri*. — Poume, Tiaré (*Deplanche* 153).

Breynia disticha Müll. Arg. var. *neo caledonica* Müll.-Arg. — Nouvelle-Calédonie (*Deplanche* 471).

Hemicyclia Deplanchei Baill. Ex Guillaum. = *Elaeocarpus Deplanchei* Brong. et Gris. est aussi identique à *Xylosma caledonicum* Briq. = *Myroxylon caledonicum* Briq. — *Hisingera caledonica* Panch. ex Briq.

C'est une Euphorbiacée et non une Bixacée.

Croton insulare Baill. — Gatope (*Vieillard* 3208).

1. Outre les échantillons recueillis pour BERNIER et le Musée colonial de Nouméa, CRIBS (Léon), habitant alors chez M. BARON, avenue Wagram, à Nouméa, s'était fait marchand de plantes séchées moyennant 0 fr. 50 pièce et exécutait de petits tableaux faits de plantes néo-calédoniennes.

2. Acanthacées déterminées par M. R. BENOIST.

Claoxylon insularum Müll.-Arg. — Wagap (*Vieillard* 2455).

Cleidion claoxyloides Müll.-Arg. — Wagap (*Vieillard* 1).

C. Vieillardii Müll.-Arg. var. *genuinum* Müll.-Arg. — Wagap (*Vieillard* 1130).

Macaranga alchorneoides Pax et Liegelsh. — Wagap (*Vieillard* 3192).

M. fulvescens Schltr. — Wagap (*Vieillard* 3214).

Fatoua pilosa Bur. var. *subcordata* Bur. — Ile des Pins (*Vieillard* 3234).

Casuarina Cunninghamiana Miq. — Sans localité (*Cribs*).

Oberonia flexuosa Schltr. — Sarraméa (*Cribs*).

Heliconia Bihai L. — Sans localité (*Baudouin*) Ruisseau du Pont des Français, au dessus de la Ferme modèle (*Balansa* 670).

* *Canna indica* L. — Gatope (*Deplanche* 587).

Lemna minor L. — Canala (*Balansa* 1712), bords du Diahot à Tchiao (*Balansa* 3112), Bourail (*Balansa* 1367).

L. oligorhiza Kurz. = *Spirodela oligorhiza* Hegelm. — Bords du Diahot à Tchiao (*Balansa* 3111).

Les 2 espèces peuvent se reconnaître ainsi :

A. — Plusieurs racines..... *L. oligorhiza*

B. — 1 seule racine..... *L. minor*

Killingia monocephala Rottb. — Nouvelle-Calédonie (*Baudouin* 728).

Mariscus latiflorus C. B. Clarke. — Bourail et environs (*Exposition universelle de 1900*, 430).

Rhynchospora aurea Vahl. — Nouvelle-Calédonie (*Baudouin* 744).

Imperata arundinacea Cyr. — Nouméa (*Baudouin* 581).

Saccharum officinarum L. — Dombéa (*Baudouin* 605).

Ischæmum muticum L. — Wagap (*Vieillard* 1516).

Andropogon cinctus Steud. — Nouméa (*Vieillard* 583), Gatope (*Vieillard* 1513).

Chloris cynodoides Bal. — Nouvelle-Calédonie (*Germain*), Gatope (*Vieillard* 3345 p. p.), île des Pins (*Germain*).

* *C. Gayana* Kunth. — De graines recueillies dans un emballage provenant de Nouméa et semées au Fruticetum du Muséum en 1935.

Eleusine indica Gaertn. — Gatope (*Vieillard* 3345 p. p.), Kouenthio (*Brousmiche*), île des Pins (*Germain*).

Panicum sanguinale L. — Nouméa (*Germain*), Saint-Vincent, Tomo (*Brousmiche*) île des Pins (*Germain*).